



BRASMAX
TEM RENDIMENTO



Guará

sementes

Guia de Cultivares

2026



Nossa missão, começou com Henricus Johannes Maria Aernoudts. No nome, carregamos a garra e a esperteza de um lobo Guará. É dessa figura que herdamos nosso jeito estratégico e perspicaz de planejar cada plantio nos mínimos detalhes.

Somos sinônimo de experiência, qualidade e tradição desde 1977. Às vésperas de completarmos meio século de existência, nos apresentamos com a mesma pureza semeada lá atrás. Hoje, colhemos sem receio a convicção de estarmos compartilhando com cada cliente produtor, um trabalho sério, honesto e rico em desenvolvimento.

Nossa história teve início com a produção de grãos de trigo, milho, soja, aveia e cevada. A excelência do cultivo, é o que torna nossa marca referência quando o assunto é olhar para a qualidade de nossas sementes além da habitual quantidade presente no mercado.

Nossos processos, existem para potencializar cada vez mais um trabalho baseado na análise minuciosa de grãos altamente inovadores e produtivos. Nascemos da paixão pelo campo. Do amor pela terra, pela germinação positiva. Cultivamos, ao longo de uma geração, uma herança responsável com foco no resultado satisfatório de quem planta, colhe e comercializa sementes testadas e aprovadas.

Nossos grãos estão espalhados pelo Brasil afora. Marcamos presença nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Hoje, nossas forças estão alinhadas às expectativas obtidas a partir da excelência da produção e comercialização de sementes de soja e trigo.

Da experiência local à multiplicação final. Do plantio baseado em dados à colheita rica em qualidade e eficiência. A atuação da marca Guará está firmada no respeito ao meio ambiente e na preservação dos recursos naturais. É isso que carregamos como princípio. É isso que compartilhamos em cada relacionamento.


Somos granja. Somos sementes. Somos Guará. Desde 1977 acreditamos que experiência e qualidade é sinônimo de tradição. Existimos para ser elo de força, inovação e desenvolvimento no campo.



**Qualidade
Guará.**

Grupo de
maturação **6.3**Peso de
mil grãos **154 g**Ramificação
AltaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤



Pontos fortes


- Alto potencial produtivo nas regiões mais quentes;
- Ampla janela de plantio;
- Alto potencial de ramificação;
- Resistência à podridão radicular de Phytophthora - Raça 1.

Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET 01 10 20	OUT 01 10 20	NOV 01 10 20	DEZ 01 10 20	População (plantas finais) ³
MS							
Arenito	202	110					200-320
Sul (sequeiro)	206	110					200-320
Sul (várzea)	206	110					200-320
Oeste	207	110					200-320
PR							
Oeste (abaixo 500m altitude)	201	122					200-320
Oeste (acima 500m altitude)	201	131					200-280
Arenito	202	110					200-320
Centro (abaixo 600m altitude)	203	114					200-320
Centro (acima 600m altitude)	203	122					200-300
Norte (abaixo 600m altitude)	203	114					200-320
Norte (acima 600m altitude)	203	122					200-300
SP							
Arenito	202	110					220-320
Sudoeste (abaixo 600m altitude)	203	114					200-320
Sudoeste (acima 600m altitude)	203	122					200-320
Centro	204	114					220-320
Oeste	205	114					220-320

■ Preferencial

■ Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Sintomas de fitotoxicidade, caracterizados por folha carijó, podem ser observados em tratamentos contendo alguns Ingredientes Ativos pertencentes aos grupos químicos dos triazóis e triazolinionas. Esses sintomas podem estar associados a aplicações de fungicidas em condições ambientais adversas ou dependendo do estágio tecnológico da planta no momento da aplicação. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX POTÊNCIA RR (GM 6.7) e BRASMAX VALENTE RR (GM 6.7).

Grupo de
maturação **6.5**Peso de
mil grãos **154 g**Ramificação
AltaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤

Pontos fortes

- Alto potencial produtivo nas regiões mais quentes;
- Excelente pacote sanitário;
- Ampla janela de plantio;
- Resistência à podridão radicular de Phytophthora - Raça 1.

Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET 01 10 20	OUT 01 10 20	NOV 01 10 20	DEZ 01 10 20	População (plantas finais) ³
MS							
Arenito	202	112					220-340
Sul (sequeiro)	206	112					220-340
Sul (várzea)	206	112					220-340
Oeste	207	112					220-340
PR							
Sudoeste	103	138					200-250
Sul	104	135					180-250
Oeste (abaixo 500m)	201	125					220-320
Oeste (acima 500m)	201	134					220-280
Arenito	202	112					220-340
Centro (abaixo 600m)	203	116					220-320
Centro (acima 600m)	203	124					220-300
Norte (abaixo 600m)	203	116					220-320
Norte (acima 600)	203	124					220-300
RS							
Sul (sequeiro)	101	136					200-280
Sul (várzea)	101	136					200-280
Missões	102	136					200-280
Planalto	103	138					200-250
Campos de Cima da Serra	104	138					200-250
SC							
Oeste	103	138					200-250
Leste	104	138					200-250
SP							
Sul	104	128					200-280
Arenito	202	112					220-340
Sudoeste (abaixo 600m)	203	116					220-320
Sudoeste (acima 600m)	203	124					220-320
Centro	204	116					220-320
Oeste	205	116					220-320


■ Preferencial

■ Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX POTÊNCIA RR (GM 6.7) e BRASMAX VALENTE RR (GM 6.7).

Grupo de
maturação **6.4**Peso de
mil grãos **156 g**Ramificação
AltaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤



Pontos fortes

- Alto potencial produtivo nas regiões mais quentes;
- Excelente pacote sanitário;
- Ampla janela de plantio;
- Resistência à podridão radicular de Phytophthora - Raça 1.

Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET 01 10 20	OUT 01 10 20	NOV 01 10 20	DEZ 01 10 20	População (plantas finais) ³
MS							
Arenito	202	111					200-340
Sul (sequeiro)	206	111					200-340
Sul (várzea)	206	111					200-340
Oeste	207	111					200-340
PR							
Sudoeste	103	138					200-250
Sul	104	138					180-250
Oeste (abaixo 500m)	201	124					200-320
Oeste (acima 500m)	201	133					200-280
Arenito	202	111					220-340
Centro (abaixo 600m)	203	115					220-320
Centro (acima 600m)	203	123					220-300
Norte (abaixo 600m)	203	115					220-320
Norte (acima 600)	203	123					220-300
RS							
Sul (sequeiro)	101	136					200-280
Sul (várzea)	101	136					200-280
Missões	102	136					200-280
Planalto	103	138					200-250
Campos de Cima da Serra	104	138					200-250
SC							
Oeste	103	138					200-250
Leste	104	138					200-250
SP							
Sul	104	128					200-280
Arenito	202	111					220-340
Sudoeste (abaixo 600m)	203	115					220-320
Sudoeste (acima 600m)	203	123					220-320
Centro	204	115					220-320
Oeste	205	115					220-320

Preferencial

Tolerada


¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX POTÊNCIA RR (GM 6.7) e BRASMAX VALENTE RR (GM 6.7).

Grupo de
maturação **5.6**Peso de
mil grãos **185 g**Ramificação
MédiaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤

Pontos fortes

- Estabilidade produtiva;
- Boa arquitetura de planta;
- Bom potencial produtivo com tolerância à Ferrugem Asiática;
- Elevado peso de mil grãos;
- Resistência à podridão radicular de Phytophthora - Raça 1.



Época de semeadura	Micro	Ciclo médio¹ (dias)²	SET 01 10 20	OUT 01 10 20	NOV 01 10 20	DEZ 01 10 20	População (plantas finais)³
PR							
Sudoeste	103	126					200-280
Sul	104	128					200-280
Oeste (acima 500m)	201	119					220-300
Centro (acima 600m)	203	108					260-350
Norte (acima 700m)	203	108					260-350
RS							
Sul (sequeiro)	101	127					230-320
Missões	102	126					230-320
Planalto	103	127					200-270
Campos de Cima da Serra	104	128					200-270
SC							
Oeste	103	126					200-280
Leste	104	128					200-270
SP							
Sul	104	118					200-280

■ Preferencial

■ Tolerada


¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX ATIVA RR (GM 5.6).

Grupo de
maturação **6.5**Peso de
mil grãos **177 g**Ramificação
AltaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤

Pontos fortes

- Alto potencial produtivo;
- Porte controlado com resistência ao acamamento;
- Alto potencial de ramificação;
- Ideal para ambientes de alta tecnologia;
- Resistência à podridão radicular de Phytophthora - Raça 1.




Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET 01 10 20	OUT 01 10 20	NOV 01 10 20	DEZ 01 10 20	População (plantas finais) ³
MS							
Sul (sequeiro)	206	112					250-320
PR							
Sudoeste	103	138					200-250
Sul	104	138					200-250
Oeste (abaixo 500m)	201	125					250-350
Oeste (acima 500m)	201	134					250-300
Centro (abaixo 600m)	203	116					250-350
Centro (acima 600m)	203	124					250-320
Norte (abaixo 600m)	203	116					250-350
Norte (acima 600m)	203	124					250-320
RS							
Sul (sequeiro)	101	138					220-280
Missões	102	138					220-280
Planalto	103	138					200-250
Campos de Cima da Serra	104	138					200-250
SC							
Oeste	103	138					200-250
Leste	104	138					200-250
SP							
Sul	104	128					250-300
Sudoeste (abaixo 600m)	203	116					250-350
Sudoeste (acima 600m)	203	124					250-350

■ Preferencial ■ Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX VALENTE RR (GM 6.7) e/ou BRASMAX POTÊNCIA RR (GM 6.7).

Grupo de
maturação **6.5**Peso de
mil grãos **150 g**Ramificação
AltaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤



Pontos fortes

- Alto potencial produtivo;
- Excelente adaptação nas regiões de menor altitude;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência à podridão radicular de Phytophthora - Raça 1.

Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET 01 10 20	OUT 01 10 20	NOV 01 10 20	DEZ 01 10 20	População (plantas finais) ³
MS							
Arenito	202	112					220-320
Sul (sequeiro)	206	112					220-320
Oeste	207	112					220-320
PR							
Oeste (abaixo 500m)	201	125					220-320
Oeste (acima 500m)	201	134					200-280
Arenito	202	112					220-320
Centro (abaixo 600m)	203	116					220-320
Centro (acima 600m)	203	124					200-300
Norte (abaixo 600m)	203	116					220-320
Norte (acima 600m)	203	124					200-300
SP							
Arenito	202	112					240-340
Sudoeste (abaixo 600m)	203	116					220-320
Sudoeste (acima 600m)	203	124					200-300
Centro	204	116					240-340
Oeste	205	116					240-340

Preferencial

Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. ²Dias após a emergência. ³Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear 66 E (GM 6.6). O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences LLC e da M.S. Technologies, L.L.C. Enlist E3® e Conkesta E3® são marcas registradas da Dow AgroSciences L.L.C

Grupo de
maturação **6.4**

Peso de
mil grãos **157 g**

Ramificação
Alta

Exigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤

Pontos fortes

- Alto potencial produtivo nas regiões mais quentes;
- Responsiva em ambientes de alto investimento;
- Excelente arquitetura de plantas com tolerância ao acamamento;
- Elevada ramificação;
- Alto pegamento de vagens.

Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET	OUT	NOV	DEZ	População (plantas finais) ³
			01 10 20	01 10 20	01 10 20	01 10 20	
MS							
Arenito	202	111					220-320
Sul (sequeiro)	206	111					220-320
Oeste	207	111					220-320
PR							
Oeste (abaixo 500m)	201	124					200-300
Oeste (acima 500m)	201	133					180-280
Arenito	202	111					220-320
Centro (abaixo 600m)	203	115					220-300
Centro (acima 600m)	203	123					200-300
Norte (abaixo 600m)	203	115					
Norte (acima 600)	203	123					200-300
SP							
Arenito	202	111					220-320
Oeste	205	115					220-320

Preferencial

Tolerada

Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX POTÊNCIA RR (GM 6.7) e BRASMAX VALENTE RR (GM 6.7).

TITANIUM TF

I2X


56IX58RSF I2X

Grupo de
maturação **5.8**Peso de
mil grãos **201g**Ramificação
MédiaExigência à
fertilidade

① ② ③ ④ ⑤

Pontos fortes

- Bom potencial produtivo com tolerância à Ferrugem Asiática;
- Elevado PMG (Peso de mil grãos);
- Estabilidade produtiva;
- Ampla janela de plantio.



Época de semeadura	Micro	Ciclo médio ¹ (dias) ²	SET 01 10 20 01	OUT 01 10 20 01	NOV 01 10 20 01	DEZ 01 10 20	População (plantas finais) ³
PR							
Sudoeste	103	128					180-280
Sul	104	127					180-280
Oeste (abaixo 500m)	201	121					260-330
Centro (acima 600m)	203	112					280-350
Norte (acima 600m)	203	112					280-350
RS							
Sul (sequeiro)	101	127					220-300
Missões	102	125					220-300
Planalto	103	129					200-270
Campos de Cima da Serra	104	129					200-270
SC							
Oeste	103	128					180-280
Leste	104	128					200-270
SP							
Sul	104	127					220-300

Preferencial

Tolerada

Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.
Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX ALVO RR (GM 5.9) e BRASMAX ATIVA RR (GM 5.6).



Tratamento de Sementes Industrial

Qualidade e eficiência que garantem resultados

O Tratamento de Sementes Industrial (TSI) é uma das soluções mais eficazes para o controle de pragas e doenças nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas. Seu principal benefício é a garantia de um estande uniforme e saudável de plantas, fator essencial para o aumento da produtividade agrícola.

Por isso, o TSI tem se tornado cada vez mais essencial para produtores ao redor do mundo.

Controle de qualidade *rigoroso*

Nosso laboratório interno garante um rigoroso controle de qualidade, assegurando que cada lote de sementes tratadas atenda aos mais altos padrões de segurança e eficiência. Com tradição e experiência, oferecemos soluções que aumentam a produtividade das lavouras e contribuem para o sucesso do produtor.





Por que escolher o Tratamento de Sementes Industrial?

- ▶ **Uniformidade e precisão:** o TSI garante a aplicação precisa e uniforme dos produtos em cada semente, oferecendo maior controle sobre o tratamento;
- ▶ **Qualidade e vigor das sementes:** ao preservar a integridade das sementes, o tratamento assegura altos índices de germinação e vigor, promovendo um bom início para o desenvolvimento da cultura;
- ▶ **Segurança e praticidade:** ao optar por sementes já tratadas, o produtor minimiza os riscos de intoxicação, pois a exposição aos produtos é reduzida em comparação aos tratamentos realizados diretamente na propriedade;
- ▶ **Menor impacto ambiental:** com a utilização de uma menor quantidade de ingredientes ativos por área, o TSI contribui para a preservação do meio ambiente, ao reduzir a necessidade de aplicações foliares.

Quais são os principais benefícios do TSI?

- ▶ **Segurança na dosagem e cobertura:** a distribuição uniforme do inseticida em cada semente evita tanto a superdosagem quanto a subdosagem, proporcionando maior eficiência no controle de pragas;
- ▶ **Manutenção da qualidade física das sementes:** o TSI preserva a integridade das sementes, evitando rachaduras ou quebras, problemas comuns no tratamento realizado em propriedade com equipamentos inadequados;
- ▶ **Segurança para o trabalhador:** o uso de equipamentos de proteção adequados e a realização do tratamento em ambiente controlado minimizam os riscos para os tratadores e funcionários, oferecendo um ambiente de trabalho mais seguro.





www.granjaguara.com.br

@sementesguara

Escritório

Administração e Comercialização

Rua Carlos Ernesto Knorr, 300
Centro, Cx postal 291
98280-000 Panambi/RS

55 **3375 3081**

Campos de Produção

Unidade de Beneficiamento e Armazenagem

BR 158, KM 123
Palmeira das Missões/RS

55 **99947 1948**